

Outubro 2010

Consumo de Medicamentos em Meio Hospitalar

OBSERVATÓRIO DO MEDICAMENTO E PRODUTOS DE SAÚDE
DIRECÇÃO DE ECONOMIA DO MEDICAMENTO E PRODUTOS DE SAÚDE

RESUMO

O relatório de Janeiro a Agosto relativo ao consumo de medicamentos em meio hospitalar engloba todo o conjunto de hospitais do Serviço Nacional de Saúde (SNS), com excepção do Hospital Prof. Dr. Fernando da Fonseca, o qual se encontra em fase de implementação do CHNM, e das Parcerias Público Privadas (Hospital de Braga e Hospital de Cascais).

Do tratamento da informação enviada pelos hospitais salientam-se os seguintes dados:

- Entre Janeiro e Outubro de 2010 o consumo nestes hospitais foi superior a 833 milhões de euros o que representa um crescimento de 4,0% relativamente ao período homólogo.
- O Centro Hospitalar Lisboa Norte, Hospitais Universidade de Coimbra e Hospital de S. João foram as unidades hospitalares que mais contribuíram para o aumento observado devido essencialmente ao peso que representam no conjunto de hospitais analisados.
- A cedência de medicamentos abrangidos pelos Regimes Especiais de Participação no Ambulatório e a administração de medicamentos em Hospital de Dia permanecem as áreas de prestação de cuidados com maiores encargos ao nível da despesa hospitalar, e juntas representam cerca de 70% da despesa em meio hospitalar. O hospital de dia é a área com maior peso no crescimento observado seguido da Consulta Externa.
- Os Imunomoduladores e os Antivíricos continuam a ser as áreas terapêuticas com maiores encargos e juntas representam 43,6% da despesa com medicamentos em meio hospitalar. Estes grupos registaram um aumento de 14,5% e 11,3%, face ao período homólogo e contribuíram para o crescimento da despesa de 75,2% e 53,4% respectivamente.
- Foi efectuada uma análise mais desagregada dos grupos terapêuticos com maior consumo, nomeadamente Imunomoduladores, Antivíricos e Citotóxicos. Nos Imunomoduladores, o Trastuzumab é a substância activa com maior peso relativo e uma das que mais contribui para o crescimento da despesa em meio hospitalar. Destacam-se também neste grupo terapêutico os consumos crescentes dos medicamentos incluídos no Despacho n.º 20510/2008, de 24 de Julho (Etanercept, Infliximab e Adalimumab).

- Nos Antivirais, as associações fixas Efavirenz+Emtricitabina+Tenofovir e Emtricitabina+Tenofovir são os medicamentos que mais contribuíram para o crescimento do grupo terapêutico. O Atazanavir continua também a apresentar uma tendência crescente no tratamento da infeção por VIH-1.
- Os Citotóxicos continuam a apresentar um abrandamento do crescimento. As substâncias activas com maior peso neste grupo são o Imatinib, Pemetrexedo e Erlotinib. O Docetaxel, embora ainda apresente uma quota de mercado em valor elevada, tem apresentado um decréscimo da despesa provavelmente devido à introdução de medicamentos genéricos desta substância.
- Entre Janeiro e Outubro de 2010 os medicamentos órfãos que representam 6,9% da despesa total tiveram um crescimento de 17% relativamente ao período homólogo. Os medicamentos com A.U.E. constituem 1,0% da despesa, tendo apresentado um aumento de 9,9% comparativamente ao período homólogo.

Novembro de 2010

1. Consumo de Medicamentos em Meio Hospitalar

Fonte: Hospitais do SNS

1.1 - Evolução

| | Valor | Taxa de Crescimento |
|--------------|-------------|---------------------|
| 2007 | 844.298.292 | - |
| 2008 | 895.946.057 | 6,1% |
| 2009 | 970.671.979 | 8,3% |
| Jan-Out 2009 | 801.479.751 | - |
| Jan-Out 2010 | 833.864.076 | 4,0% |


Unidade: EUR

1.2 - Evolução Mensal

| Ano de 2010 | Valor | Varição Mensal | Varição Homóloga |
|-------------|-------------|----------------|------------------|
| Janeiro | 81.709.474 | - | 4,4% |
| Fevereiro | 77.754.305 | -4,8% | 5,3% |
| Março | 92.791.325 | 19,3% | 11,1% |
| Abril | 83.657.580 | -9,8% | 3,2% |
| Mai | 83.042.514 | -0,7% | 7,1% |
| Junho | 80.832.411 | -2,7% | 1,8% |
| Julho | 86.926.258 | 7,5% | 1,5% |
| Agosto | 80.995.142 | -6,8% | 6,9% |
| Setembro | 84.842.979 | 4,8% | 2,5% |
| Outubro | 81.312.089 | -4,2% | -2,8% |
| Jan - Dez | 833.864.076 | - | 4,0% |

Unidade: EUR

n = 60 Hospitais do SNS



Varição Mensal: Diferença percentual entre os valores apresentados em determinado mês relativamente aos valores do mês anterior.

Varição Homóloga: Diferença percentual entre os valores apresentados em determinado período comparativamente aos valores de igual período do ano anterior.

Peso na Varição: Contribuição de cada Hospital, Área Terapêutica ou Substância Activa, para o crescimento total da despesa do grupo em que se insere.

2. Distribuição do Consumo por Hospital

2 - Distribuição do Consumo por Hospital - Jan-Out 2010

| Hospital | Valor Acumulado | Peso Relativo | Varição Homóloga | Peso na Varição |
|--|-----------------|---------------|------------------|-----------------|
| Centro Hospitalar Lisboa Norte, E.P.E. | 110.682.038 | 13,3% | 7,4% | 23,6% |
| Hospital de S. João, EPE | 73.255.325 | 8,8% | 6,3% | 13,4% |
| Centro Hospitalar de Lisboa Central, E.P.E. | 62.587.330 | 7,5% | 0,3% | 0,6% |
| Hospitais Universidade de Coimbra | 59.337.378 | 7,1% | 8,3% | 14,1% |
| Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, E.P.E. | 48.941.544 | 5,9% | 5,7% | 8,2% |
| Centro Hospitalar do Porto, EPE | 46.010.777 | 5,5% | 5,0% | 6,8% |
| Instituto Português de Oncologia, EPE - Porto | 31.006.809 | 3,7% | 1,6% | 1,6% |
| Hospital Curry Cabral | 29.649.975 | 3,6% | 4,1% | 3,6% |
| Instituto Português de Oncologia, EPE - Lisboa | 29.487.747 | 3,5% | 7,5% | 6,4% |
| Hospital Garcia da Orta, E.P.E. | 29.116.490 | 3,5% | -1,3% | -1,2% |
| Centro Hospitalar Coimbra, EPE | 25.674.449 | 3,1% | 6,7% | 5,0% |
| Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia, EPE | 20.371.360 | 2,4% | -0,5% | -0,3% |
| Hospital Distrital de Faro | 20.221.079 | 2,4% | 2,3% | 1,4% |
| Centro Hospitalar de Setúbal, E.P.E. | 17.827.840 | 2,1% | 0,4% | 0,2% |
| Hospital de Joaquim Urbano - Porto | 14.518.743 | 1,7% | 11,4% | 4,6% |
| Centro Hospitalar do Alto Ave | 13.725.531 | 1,6% | 11,3% | 4,3% |
| Centro Hospitalar de Trás os Montes e Alto Douro | 13.385.502 | 1,6% | 5,5% | 2,1% |
| Hospital distrital de Santarém, EPE | 12.251.266 | 1,5% | 8,5% | 3,0% |
| Centro Hospitalar Barreiro Montijo, EPE | 12.174.373 | 1,5% | 0,0% | 0,0% |
| Hospital de São Teotónio, EPE - Viseu | 12.047.932 | 1,4% | 4,7% | 1,7% |
| Unidade Local de Saúde - Matosinhos | 11.057.666 | 1,3% | -19,1% | -8,1% |
| Centro Hospitalar do Barlavento Algarvio, E.P.E. | 10.508.001 | 1,3% | -6,5% | -2,3% |
| Hospital Infante D.Pedro, EPE - Aveiro | 10.345.478 | 1,2% | 21,8% | 5,7% |
| Hospital Espírito Santo, E.P.E. - Évora | 10.139.194 | 1,2% | 5,5% | 1,6% |

| Hospital | Valor Acumulado | Peso Relativo | Varição Homóloga | Peso na Varição |
|---|-----------------|---------------|------------------|-----------------|
| Instituto Português de Oncologia, EPE - Coimbra | 9.170.181 | 1,1% | -5,1% | -1,5% |
| Centro Hospitalar de Entre Douro e Vouga, EPE | 9.008.080 | 1,1% | 5,6% | 1,5% |
| Centro Hospitalar do Alto Minho, E.P.E. | 8.857.963 | 1,1% | 4,4% | 1,2% |
| Centro Hospitalar do Médio Tejo, E.P.E. | 8.762.798 | 1,1% | 7,4% | 1,9% |
| Centro Hospitalar Baixo Alentejo, E.P.E. | 7.467.232 | 0,9% | 4,4% | 1,0% |
| Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano | 6.883.367 | 0,8% | 8,9% | 1,7% |
| Centro Hospitalar Cova da Beira, E.P.E. | 6.023.108 | 0,7% | 4,3% | 0,8% |
| Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, EPE | 5.663.917 | 0,7% | -1,2% | -0,2% |
| Unidade Local de Saúde da Guarda, E.P.E. | 5.299.090 | 0,6% | 13,5% | 1,9% |
| Hospital Amato Lusitano - Castelo Branco | 5.228.286 | 0,6% | -3,3% | -0,5% |
| Hospital Santo André, E.P.E. - Leiria | 5.040.120 | 0,6% | -1,6% | -0,3% |
| Centro Hospitalar Caldas da Rainha | 4.302.314 | 0,5% | 0,3% | 0,0% |
| Centro Hospitalar do Nordeste, E.P.E. | 3.770.493 | 0,5% | 9,6% | 1,0% |
| Hospital de Reynaldo dos Santos - Vila Franca de Xira | 3.458.835 | 0,4% | 3,0% | 0,3% |
| Centro Hospitalar do Médio Ave | 3.438.508 | 0,4% | -9,7% | -1,1% |
| Hospital do Litoral Alentejano | 3.089.993 | 0,4% | 4,7% | 0,4% |
| Hospital Distrital de Torres Vedras | 2.921.651 | 0,4% | -6,3% | -0,6% |
| Hospital Distrital Figueira da Foz, E.P.E. | 2.368.829 | 0,3% | -9,0% | -0,7% |
| Hospital de Santa Maria Maior, E.P.E. - Barcelos | 1.773.057 | 0,2% | -3,0% | -0,2% |
| Maternidade Dr. Alfredo da Costa | 1.117.216 | 0,1% | -1,6% | -0,1% |
| Centro Hospitalar Póvoa de Varzim / Vila do Conde | 864.604 | 0,1% | -5,7% | -0,2% |
| Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa | 788.007 | 0,1% | -17,0% | -0,5% |
| Hospital Magalhães de Lemos | 656.546 | 0,1% | -7,3% | -0,2% |
| Hospital Distrital de Águeda | 543.552 | 0,1% | -22,1% | -0,5% |
| Instituto de Oftalmologia Dr. Gama Pinto | 541.444 | 0,1% | -15,2% | -0,3% |
| Hospital Distrital de Pombal | 425.020 | 0,1% | -0,5% | 0,0% |
| Centro Hospitalar Psiquiátrico de Coimbra | 390.180 | 0,0% | 1,5% | 0,0% |
| Hospital Bernardino Lopes Oliveira - Alcobaça | 376.758 | 0,0% | 12,7% | 0,1% |

| Hospital | Valor Acumulado | Peso Relativo | Variación Homóloga | Peso na Variación |
|---|--------------------|---------------|--------------------|-------------------|
| Hospital Distrital de Peniche | 324.567 | 0,0% | 23,9% | 0,2% |
| Hospital de Valongo | 302.513 | 0,0% | 8,8% | 0,1% |
| Hospital Dr. Francisco Zagalo - Ovar | 266.835 | 0,0% | -50,3% | -0,8% |
| Centro de Medicina de Reabilitação da Região Centro Rovisco Pais | 174.953 | 0,0% | 48,4% | 0,2% |
| Hospital do Visconde de Salreu - Estarreja | 94.243 | 0,0% | -19,0% | -0,1% |
| Hospital Arcebispo João Crisóstomo - Cantanhede | 81.939 | 0,0% | -5,3% | 0,0% |
| Hospital de Cândido de Figueiredo de Tondela | 36.637 | 0,0% | -80,5% | -0,5% |
| Hospital José Luciano de Castro - Anadia | 27.414 | 0,0% | -46,9% | -0,1% |
| Total | 833.864.076 | 100% | 4,0% | 100% |

Unidade: EUR

3. Distribuição do Consumo por Centro de Custo

3.1 - Distribuição do Consumo por Área de Actividade do Centro de Custo - Jan-Out 2010

| Área de Actividade | Valor Acumulado | Peso Relativo | Variação Homóloga | Peso na Variação |
|-------------------------------|--------------------|---------------|-------------------|------------------|
| Oncologia | 181.469.717 | 21,8% | 2,4% | 13,0% |
| Infecciologia | 152.332.492 | 18,3% | 11,7% | 49,1% |
| Medicina Interna | 59.624.427 | 7,2% | 2,5% | 4,5% |
| Neurologia | 41.943.988 | 5,0% | 6,3% | 7,7% |
| Hematologia Clínica | 39.718.196 | 4,8% | 1,9% | 2,3% |
| Nefrologia | 29.474.858 | 3,5% | -5,0% | -4,8% |
| Imuno-hemoterapia | 27.414.704 | 3,3% | 8,0% | 6,3% |
| Cirurgia Geral | 23.204.586 | 2,8% | -10,7% | -8,5% |
| Bloco Operatório | 21.890.828 | 2,6% | 10,6% | 6,5% |
| Gastrenterologia | 21.770.611 | 2,6% | 18,7% | 10,6% |
| Restantes Áreas de Actividade | 235.019.670 | 28,2% | 1,9% | 13,5% |
| Total | 833.864.076 | 100% | 4,0% | 100% |

Unidade: EUR

3. Distribuição do Consumo por Centro de Custo

3.2 - Distribuição do Consumo por Área de Prestação de Cuidados - Jan-Out 2010

| Área de Prestação de Cuidados | Valor Acumulado | Peso Relativo | Variação Homóloga | Peso na Variação |
|---|--------------------|---------------|-------------------|------------------|
| Consulta Externa | 341.055.317 | 40,9% | 5,2% | 52,3% |
| Hospital de Dia | 245.939.075 | 29,5% | 9,5% | 65,9% |
| Internamento | 160.545.270 | 19,3% | -5,5% | -29,1% |
| Unidades de Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica | 47.636.550 | 5,7% | 2,0% | 2,8% |
| Urgência | 17.401.691 | 2,1% | 0,0% | 0,0% |
| Cirurgia de Ambulatório | 2.263.128 | 0,3% | 45,5% | 2,2% |
| Serviço Domiciliário | 454.939 | 0,1% | 1,5% | 0,0% |
| Outras Secções | 18.568.106 | 2,2% | 11,2% | 5,8% |
| Total | 833.864.076 | 100% | 4,0% | 100% |

Unidade: EUR

Consultas Externas: Incluem os medicamentos dispensados no ambulatório dos serviços farmacêuticos.

Unidades de Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica: Incluem as unidades técnicas e bloco operatório.

4. Distribuição do Consumo por Grupo Farmacoterapêutico (10 +)

4 - Distribuição do Consumo por Classificação Farmacoterapêutica - Jan-Out 2010

| Classificação Farmacoterapêutica (CFT) * | Valor Acumulado | Peso Relativo | Varição Homóloga | Peso na Varição |
|--|--------------------|---------------|------------------|-----------------|
| Imunomoduladores | 192.657.747 | 23,1% | 14,5% | 75,2% |
| Antivíricos | 170.898.403 | 20,5% | 11,3% | 53,4% |
| Citotóxicos | 84.715.371 | 10,2% | -1,1% | -2,9% |
| Antibacterianos | 43.803.540 | 5,3% | -16,9% | -27,4% |
| Factores estimulantes da hematopoiese | 34.756.675 | 4,2% | -5,5% | -6,3% |
| Anti-hemorrágicos | 32.008.519 | 3,8% | 11,2% | 10,0% |
| Outros produtos | 24.764.093 | 3,0% | -8,3% | -6,9% |
| Hormonas e anti-hormonas (Antineoplásicos) | 23.149.897 | 2,8% | -11,3% | -9,1% |
| Imunoglobulinas | 22.658.736 | 2,7% | 1,6% | 1,1% |
| Correctivos das alterações hidroelectrolíticas | 18.607.221 | 2,2% | 0,9% | 0,5% |
| Outros Grupos Farmacoterapêuticos | 185.843.873 | 22,3% | 2,2% | 12,4% |
| Total | 833.864.076 | 100% | 4,0% | 100% |

* CFT de Nível 2


Unidade: EUR

4. Distribuição do Consumo por Grupo Farmacoterapêutico (10 +)

4.1 - Distribuição do Consumo de Imunomoduladores por DCI - Jan-Out 2010

| Substância Activa | Valor Acumulado | Peso Relativo | Variação Homóloga | Peso na Variação |
|----------------------------|--------------------|---------------|-------------------|------------------|
| Trastuzumab | 30.738.868 | 16,0% | 14,4% | 15,9% |
| Rituximab | 17.501.614 | 9,1% | 17,8% | 10,8% |
| Etanercept | 16.520.376 | 8,6% | 18,0% | 10,3% |
| Interferão beta-1a | 15.901.376 | 8,3% | 0,3% | 0,2% |
| Infliximab | 14.124.563 | 7,3% | 17,0% | 8,4% |
| Adalimumab | 13.675.612 | 7,1% | 72,2% | 23,5% |
| Bevacizumab | 10.644.148 | 5,5% | 5,6% | 2,3% |
| Tacrolimus | 10.450.739 | 5,4% | -16,4% | -8,4% |
| Cetuximab | 9.209.752 | 4,8% | 47,2% | 12,1% |
| Interferão beta-1b | 8.310.879 | 4,3% | -2,6% | -0,9% |
| Outras Substâncias Activas | 45.579.819 | 23,7% | 15,9% | 25,7% |
| Total | 192.657.747 | 100% | 14,5% | 100% |

Unidade: EUR




4. Distribuição do Consumo por Grupo Farmacoterapêutico (10 +)

4.2 - Distribuição do Consumo de Antivíricos por DCI - Jan-Out 2010

| Substância Activa | Valor Acumulado | Peso Relativo | Variação Homóloga | Peso na Variação |
|---------------------------------------|--------------------|---------------|-------------------|------------------|
| Emtricitabina + Tenofovir | 35.205.973 | 20,6% | 10,7% | 19,7% |
| Lopinavir + Ritonavir | 19.987.629 | 11,7% | -3,8% | -4,5% |
| Efavirenz + Emtricitabina + Tenofovir | 18.556.419 | 10,9% | 201,2% | 71,6% |
| Atazanavir | 14.225.595 | 8,3% | 30,3% | 19,1% |
| Efavirenz | 12.482.904 | 7,3% | -21,5% | -19,7% |
| Lamivudina + Zidovudina | 10.504.555 | 6,1% | -19,7% | -14,9% |
| Tenofovir | 8.618.459 | 5,0% | 3,7% | 1,8% |
| Abacavir + Lamivudina | 7.994.307 | 4,7% | 29,4% | 10,5% |
| Raltegravir | 6.110.439 | 3,6% | 65,9% | 14,0% |
| Valganciclovir | 5.463.162 | 3,2% | 16,2% | 4,4% |
| Outras Substâncias Activas | 31.748.961 | 18,6% | -1,1% | -2,0% |
| Total | 170.898.403 | 100% | 11,3% | 100% |

Unidade: EUR




4. Distribuição do Consumo por Grupo Farmacoterapêutico (10 +)

4.3 - Distribuição do Consumo de Citotóxicos por DCI - Jan-Out 2010

| Substância Activa | Valor Acumulado | Peso Relativo | Varição Homóloga | Peso na Variação |
|----------------------------|-------------------|---------------|------------------|------------------|
| Imatinib | 18.948.652 | 22,4% | 5,6% | -106,7% |
| Docetaxel | 12.147.871 | 14,3% | -29,4% | 538,5% |
| Erlotinib | 5.729.572 | 6,8% | 28,2% | -133,8% |
| Pemetrexedo | 5.328.488 | 6,3% | 20,1% | -94,9% |
| Capecitabina | 4.999.128 | 5,9% | 6,8% | -34,0% |
| Bortezomib | 4.222.678 | 5,0% | -0,9% | 4,2% |
| Sunitinib | 4.162.019 | 4,9% | 5,6% | -23,4% |
| Temozolomida | 3.834.735 | 4,5% | 7,8% | -29,5% |
| Doxorrubicina | 3.363.914 | 4,0% | 6,7% | -22,3% |
| Sorafenib | 2.906.795 | 3,4% | 64,7% | -121,3% |
| Outras Substâncias Activas | 19.071.517 | 22,5% | -5,7% | 123,2% |
| Total | 84.715.371 | 100% | -1,1% | 100% |

Unidade: EUR



5. Distribuição do Consumo por Substância Activa (20 +)

5 - Distribuição do Consumo por Substância Activa - Jan-Out 2010

| Substância Activa | Valor Acumulado | Peso Relativo | Varição Homóloga | Peso na Varição |
|---------------------------------------|--------------------|---------------|------------------|-----------------|
| Emtricitabina + Tenofovir | 35.205.973 | 4,2% | 10,7% | 10,5% |
| Trastuzumab | 30.738.868 | 3,7% | 14,4% | 11,9% |
| Imunoglobulina humana normal | 20.334.811 | 2,4% | 1,7% | 1,1% |
| Lopinavir + Ritonavir | 19.987.629 | 2,4% | -3,8% | -2,4% |
| Imatinib | 18.948.652 | 2,3% | 5,6% | 3,1% |
| Efavirenz + Emtricitabina + Tenofovir | 18.556.419 | 2,2% | 201,2% | 38,3% |
| Rituximab | 17.501.614 | 2,1% | 17,8% | 8,2% |
| Etanercept | 16.520.376 | 2,0% | 18,0% | 7,8% |
| Interferão beta-1a | 15.901.376 | 1,9% | 0,3% | 0,2% |
| Atazanavir | 14.225.595 | 1,7% | 30,3% | 10,2% |
| Darbepoetina alfa | 14.214.699 | 1,7% | -1,8% | -0,8% |
| Infliximab | 14.124.563 | 1,7% | 17,0% | 6,3% |
| Adalimumab | 13.675.612 | 1,6% | 72,2% | 17,7% |
| Efavirenz | 12.482.904 | 1,5% | -21,5% | -10,5% |
| Docetaxel | 12.147.871 | 1,5% | -29,4% | -15,6% |
| Cloreto de sódio | 10.755.747 | 1,3% | 3,6% | 1,2% |
| Bevacizumab | 10.644.148 | 1,3% | 5,6% | 1,7% |
| Lamivudina + Zidovudina | 10.504.555 | 1,3% | -19,7% | -8,0% |
| Tacrolimus | 10.452.335 | 1,3% | -16,4% | -6,3% |
| Meropenem | 9.210.787 | 1,1% | -17,6% | -6,1% |
| Outras Substâncias Activas | 507.729.541 | 60,9% | 2,1% | 31,6% |
| Total | 833.864.076 | 100% | 4,0% | 100% |

Unidade: EUR

6. Monitorização do Consumo de Grupos Específicos de Medicamentos

6.1 - Evolução do Consumo de Medicamentos Órfãos - Jan-Out 2010

| Substância Activa | Indicações Terapêuticas | Valor Acumulado | Peso Relativo | Varição Homóloga | Peso na Varição |
|---------------------|--|-----------------|---------------|------------------|-----------------|
| Imatinib | Leucemia Mielóide Crónica; Tumor Maligno do Estroma GI; Síndrome mielodisplásica/doenças mieloproliferativas; Síndrome hipereosinofílica avançada e/ou leucemia eosinofílica crónica; Leucemia Linfoblástica Aguda; Dermatofibrossarcoma protuberans | 18.948.652 | 32,7% | 5,6% | 11,9% |
| Bosentano | Hipertensão Arterial Pulmonar; Hipertensão Pulmonar Tromboembólica Crónica; Esclerose Sistémica; Fibrose Pulmonar Idiopática | 8.503.194 | 14,7% | 7,9% | 7,4% |
| Galsulfase | Mucopolissacaridose tipo VI (síndrome de Maroteaux-Lamy) | 4.391.292 | 7,6% | 18,4% | 8,1% |
| Lenalidomida | Mieloma Múltiplo | 4.269.310 | 7,4% | 59,7% | 18,9% |
| Sorafenib | Carcinoma hepatocelular; Carcinoma de células renais avançado | 2.906.795 | 5,0% | 64,7% | 13,5% |
| Dasatinib | Tratamento de doentes adultos com leucemia mielóide crónica; Tratamento da leucemia linfoblástica aguda (LLA) positiva para o cromossoma Filadélfia (Ph+) e com LMC linfoblástica | 2.506.574 | 4,3% | 21,4% | 5,3% |
| Agalsidase alfa | Doença de Fabry | 2.200.746 | 3,8% | 167,5% | 16,3% |
| Talidomida | Mieloma Múltiplo; Eritema nodoso lepromatoso; Tratamento da reacção do enxerto contra o hospedeiro (graft versus host disease) | 1.966.459 | 3,4% | 3,5% | 0,8% |
| Alglucosidase alfa | Doença de Pompe | 1.724.635 | 3,0% | 20,7% | 3,5% |
| Idursulfase | Síndrome de Hunter | 1.708.313 | 2,9% | 10,1% | 1,9% |
| Laronidase | Mucopolissacaridose I | 1.092.504 | 1,9% | -1,3% | -0,2% |
| Sildenafil | Hipertensão Arterial Pulmonar | 876.462 | 1,5% | 44,4% | 3,2% |
| Iloprost | Hipertensão Pulmonar Primária | 698.349 | 1,2% | 23,8% | 1,6% |
| Trabectedina | Cancro do Ovário | 688.578 | 1,2% | 317,9% | 6,2% |
| Miglustato | Doença de Niemann-Pick, tipo C | 623.075 | 1,1% | 22,5% | 1,4% |
| Agalsidase beta | Doença de Fabry | 569.428 | 1,0% | -72,6% | -17,9% |
| Pegvisomant | Acromegália | 562.053 | 1,0% | 7,5% | 0,5% |
| Anagrelida | Trombocitémia Essencial | 544.851 | 0,9% | 39,1% | 1,8% |
| Desferriroxo | Sobrecarga Crónica de Ferro | 358.652 | 0,6% | 30,0% | 1,0% |
| Ambrisentano | Hipertensão Arterial Pulmonar; Hipertensão Pulmonar Tromboembólica Crónica | 318.736 | 0,6% | 2090,2% | 3,6% |
| Bussulfano | Tratamento condicionante (de preparação) de adultos e crianças antes de um transplante de células progenitoras hematopoiéticas | 310.219 | 0,5% | 10,1% | 0,3% |
| Plerixafor | Transplante autólogo em doentes com linfoma ou mieloma múltiplo | 309.852 | 0,5% | - | 3,7% |
| Romiplostim | Púrpura Trombocitopénica Idiopática | 295.434 | 0,5% | 2083,0% | 3,3% |
| Sitaxentano | Hipertensão arterial pulmonar; Hipertensão pulmonar crónica | 251.426 | 0,4% | 35,5% | 0,8% |
| Nitisona | Tirosinemia hereditária do tipo 1; Alcaptonúria | 210.852 | 0,4% | -3,7% | -0,1% |
| Nilotinib | Leucemia mielóide crónica (LMC) | 180.495 | 0,3% | 9,4% | 0,2% |
| Temsirolimus | Carcinoma de células renais avançado | 175.362 | 0,3% | 27,3% | 0,4% |
| Trióxido de arsénio | Leucemia promielocítica aguda, mieloma múltiplo e síndromas mielodisplásicos | 150.045 | 0,3% | -8,6% | -0,2% |
| Clofarabina | Leucemia Linfoblástica Aguda em doentes pediátricos | 145.337 | 0,3% | 90,8% | 0,8% |

| Substância Activa | Indicações Terapêuticas | Valor Acumulado | Peso Relativo | Variação Homóloga | Peso na Variação |
|--|--|-------------------|---------------|-------------------|------------------|
| Ibuprofeno | Persistência do canal arterial hemodinamicamente significativa em recém-nascidos pré-termo com idade gestacional inferior a 34 semanas. | 79.073 | 0,1% | 1203,7% | 0,9% |
| Estiripentol | Tratamento adjuvante de convulsões refractárias tónico-clónicas generalizadas, em doentes com epilepsia mioclónica grave da infância | 72.403 | 0,1% | 22,9% | 0,2% |
| Mitotano | Carcinoma adrenocortical avançado | 71.339 | 0,1% | -52,9% | -1,0% |
| Mecassermina | Deficiências do crescimento em crianças e adolescentes que sofrem de deficiência primária grave de uma hormona, o factor de crescimento-1 semelhante à insulina (IGF-1). | 52.191 | 0,1% | 200,9% | 0,4% |
| Betaina | Homocistinúria | 49.042 | 0,1% | 479,2% | 0,5% |
| Levodopa + Carbidopa | Tratamento da doença de Parkinson de estado avançado | 35.180 | 0,1% | 306,0% | 0,3% |
| Icatibant | Tratamento sintomático de episódios agudos de angioedema hereditário (AEH) em doentes adultos | 24.089 | 0,0% | - | 0,3% |
| Azacitidina | Leucemia Mielóide Aguda; Síndromas Mielodisplásicos | 22.467 | 0,0% | - | 0,3% |
| Acetato de zinco | Doença de Wilson | 20.850 | 0,0% | 42,4% | 0,1% |
| Ziconotida | Tratamento de dor crónica e intensa em adultos que necessitam de analgesia intratecal | 15.071 | 0,0% | 234,4% | 0,1% |
| Ácido carginómico | Hiperamoniemia provocada por uma deficiência de N-acetilglutamato sintase | 4.898 | 0,0% | - | 0,1% |
| Porfímero sódico | Displasia de Grau Elevado no Esófago de Barret; Colangiocarcinoma | 2.560 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Total | | 57.936.843 | 100% | 17,0% | 100% |
| Peso dos Medicamentos Órfãos no Total do Consumo Hospitalar | | | 6,9% | | |

Unidade: EUR

Nota: Esta Tabela inclui apenas medicamentos para os quais já foi atribuída A.I.M. (Autorização de Introdução no Mercado).

6. Monitorização do Consumo de Grupos Específicos de Medicamentos

6.2 - Evolução do Consumo de Medicamentos com A.U.E. - Jan-Out 2010

| Substância Activa | Valor Acumulado | Peso Relativo | Varição Homóloga | Peso na Varição |
|--|------------------|---------------|------------------|-----------------|
| Azacitidina | 1.409.604 | 17,6% | 35,5% | 51,2% |
| Antitripsina alfa-1 | 722.063 | 9,0% | 63,3% | 38,8% |
| Ranibizumab | 648.424 | 8,1% | -15,4% | -16,4% |
| Fulvestrant | 495.063 | 6,2% | 7,4% | 4,7% |
| Dexametasona | 461.846 | 5,8% | 136,2% | 36,9% |
| Pegaspargase | 242.491 | 3,0% | 39,5% | 9,5% |
| Fludarabina | 201.995 | 2,5% | -12,5% | -4,0% |
| Triamcinolona | 190.275 | 2,4% | 37,7% | 7,2% |
| Procarbazina | 167.072 | 2,1% | -9,1% | -2,3% |
| N-acetilgalactosamina -4-sulfatase | 151.749 | 1,9% | -66,8% | -42,3% |
| Asparaginase | 142.061 | 1,8% | -17,5% | -4,2% |
| Concentrado de C1-inibidor esterase | 142.020 | 1,8% | -36,3% | -11,2% |
| Trientina | 140.084 | 1,8% | 33,5% | 4,9% |
| Isoprenalina | 120.701 | 1,5% | 183,9% | 10,8% |
| Labetalol | 119.768 | 1,5% | 12,1% | 1,8% |
| Sol cardioplegia sanguínea | 101.024 | 1,3% | 15,7% | 1,9% |
| Fluoresceína | 97.099 | 1,2% | -8,1% | -1,2% |
| Histamina | 94.536 | 1,2% | -20,7% | -3,4% |
| Levotiroxina sódica | 84.229 | 1,1% | 11,0% | 1,2% |
| Dantroleno | 78.172 | 1,0% | 26,1% | 2,2% |
| Outras Substâncias Activas com A.U.E. | 2.187.889 | 27,4% | 0,2% | 0,6% |
| Total | 7.998.164 | 100% | 9,9% | 100% |
| Peso dos Medicamentos com A.U.E. no Total do Consumo Hospitalar | | 1,0% | | |

A.U.E. - Autorização de Utilização Especial

Unidade: EUR