

N.º 030/CA

Data: 2005-03-16

Assunto: **Nota de esclarecimento sobre a Circular Informativa relativa ao uso dos medicamentos Elidel® (pimecrolimus) e Protopic® (tacrolimus)**

Para: Público e Profissionais de Saúde (*Site* do INFARMED)

Contacto no INFARMED: DGREE/ Departamento de Farmacovigilância

Relativamente à Circular Informativa n.º 028/CA, divulgada a 11 de Março de 2005, sobre os medicamentos Protopic® (tacrolimus) e Elidel® (pimecrolimus), o INFARMED, no sentido de melhor esclarecer os profissionais de saúde e o público, informa que as indicações terapêuticas mencionadas no Resumo das Características do Medicamento (RCM) em vigor para os referidos medicamentos são as seguintes:


Elidel® (pimecrolimus) – Edidel® está indicado para doentes com dermatite atópica (eczema) ligeira a moderada, com idade igual ou superior a 2 anos para:

- o tratamento a curto termo dos sinais e sintomas;
- o tratamento intermitente a longo termo para prevenção da progressão para erupções.

Protopic® 1 mg/g (tacrolimus) – Tratamento de dermatite atópica moderada a grave, em adultos, que não têm uma resposta adequada, ou são intolerantes às terapêuticas convencionais.

Protopic® 0,3 mg/g (tacrolimus) – Tratamento de dermatite atópica moderada a grave, em adultos, que não têm uma resposta adequada, ou são intolerantes às terapêuticas convencionais. Tratamento da dermatite atópica moderada a grave, em crianças (a partir dos 2 anos de idade), que não têm uma resposta adequada às terapêuticas convencionais.

O Conselho de Administração,



(António Faria Vaz)