

Hidroaltesona®

(Hidrocortisona)

Vía oral

COMPOSICIÓN POR COMPRIMIDO

Hidrocortisona (D.C.I.)	20 mg
Almidón pregelatinizado de maíz sin gluten	52 mg
Lactosa	118 mg
Otros excipientes (estearato magnésico, talco)	c.s.

PROPIEDADES

Hormona corticosteroide, cuya propiedad fundamental consiste en suprimir rápidamente las manifestaciones inflamatorias locales y agudas de los tejidos.

INDICACIONES

Reumatismo articular agudo, artritis reumatoide, enfermedad de Still, gota, asma bronquial, colitis ulcerosa. Enfermedades alérgicas agudas. Lupus eritematoso, dermatomiositis, esclerodermia, sarcoidosis, periarteritis nudosa y demás enfermedades del colágeno. Mielosis y linfadenosis leucémicas agudas y crónicas, enfermedad hemolítica. Infecciones hiperagudas (asociada a antibióticos). Es indispensable en el tratamiento de la enfermedad de Addison, síndrome de Waterhouse-Friderischen y demás cuadros de insuficiencia suprarrenal aguda o crónica.

POSOLÓGÍA

3-6 comprimidos diarios hasta obtener respuesta adecuada, disminuyendo después gradualmente la dosis hasta lograr la curación del proceso o hasta encontrar la dosis mínima eficaz de mantenimiento.

NORMAS PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN

Tómese por vía oral con un poco de agua.

CONTRAINDICACIONES

En los procesos infecciosos agudos y en tuberculosis, siempre que se requiera su empleo, hay que asociarla a los antibióticos o quimioterápicos más adecuados.

ADVERTENCIAS

Esta especialidad contiene lactosa. Se han descrito casos de intolerancia a este componente en niños y adolescentes. Aunque la cantidad presente en el preparado no es, probablemente, suficiente para desencadenar los síntomas de intolerancia, en caso de que aparecieran diarreas, debe consultar a su médico.

Uso en deportistas: Se informa a los deportistas que este medicamento contiene un componente que puede establecer un resultado analítico de control de dopaje como positivo.

PRECAUCIONES

No es aconsejable prolongar su empleo, o hay que extremar la vigilancia, en las cardiopatías descompensadas de tipo congestivo, diabetes grave, hipertensión, heridas abiertas, psicosis latente o manifiesta y/o úlcera gastroduodenal.

INTERACCIONES

Puede disminuir la acción de los hipoglucemiantes orales. Administrado con glucósidos cardiotónicos, aumenta la incidencia de arritmias o de toxicidad digitálica asociada con hipokalemia (deplección de potasio).

La rifampicina disminuye la acción del corticoide.

EFECTOS SECUNDARIOS

La administración continua e indiscriminada de corticoides puede determinar una hipoplasia de las glándulas suprarrenales.

No debe interrumpirse bruscamente el tratamiento, porque puede originarse el síndrome de retirada de corticoides, con manifestaciones de fiebre, dolor de cabeza, hipotensión.

Si se observa cualquier otra reacción adversa no descrita anteriormente, consulte a su médico o farmacéutico.

INTOXICACIONES Y SU TRATAMIENTO

No se han observado.

En caso de sobredosis o ingestión accidental, consultar al Servicio de Información Toxicológica. Teléfono (91) 562 04 20.

PRESENTACIÓN

Envases con 10 y 30 comprimidos.

LOS MEDICAMENTOS DEBEN MANTENERSE FUERA
DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

CON RECETA MÉDICA



ALTER

LABORATORIOS ALTER, S.A. - Mateo Inurria, 30 - 28036 MADRID