

Protocolo de Dispensa Exclusiva em Farmácia (EF)	
O presente protocolo permite auxiliar o farmacêutico a dispensar o medicamento após análise, evitar a dispensa inapropriada caso não sejam cumpridas as condições estabelecidas e detetar situações que devem ser referenciada para a consulta médica.	
DCI / Dosagem	Macrogol e outras associações
Classe farmacológica	6. Aparelho digestivo / 6.3. Modificadores da motilidade gastrointestinal / 6.3.2. Modificadores da motilidade intestinal / 6.3.2.1. Laxantes e catárticos / 6.3.2.1.4. Laxantes osmóticos / Macrogol e outras associações
Condição Dispensa EF	Lavagens gastrointestinais e preparação para exames complementares de diagnóstico ou cirurgia
Via de administração	Administração oral

1 – FACTORES A TER EM CONSIDERAÇÃO:

- 1- Idade
- 2- Hipersensibilidade à substância ativa ou aos excipientes
- 3- Gravidez e amamentação
- 4- Medicação concomitante
- 5- Co-morbilidades

CONDIÇÕES Dispensa EF

- Lavagens gastrointestinais e preparação para exames complementares de diagnóstico ou cirurgia
- Idade superior a 18 anos

CRITÉRIOS PARA REFERENCIAÇÃO PARA A CONSULTA MÉDICA:

- Idade inferior a 18
- Hipersensibilidade à substância ativa ou aos excipientes
- Qualquer das patologias ou situações. mencionadas no anexo

SE CUMPRE CUMULATIVAMENTE CONDIÇÕES DISPENSA “EF” DISPENSAR O MEDICAMENTO E PRESTAR INFORMAÇÃO / RECOMENDAÇÕES DE UTILIZAÇÃO:

O medicamento é de toma única.

A forma de preparação, administração e recomendações de utilização do medicamento são importantes para que posteriormente seja possível efetuar o exame complementares de diagnóstico ou cirurgia.

Cabe ao farmacêutico prestar a informação anteriormente referida, de acordo com a informação que consta no RCM/FI do medicamento dispensado.

CUMPRE QUALQUER UM DOS CRITÉRIOS

↓

REFERENCIAÇÃO PARA A CONSULTA MÉDICA

Protocolo de Dispensa Exclusiva em Farmácia – Anexo Macrogol e outras associações	
DCI	Macrogol e outras associações
Classe farmacológica	6. Aparelho digestivo / 6.3. Modificadores da motilidade gastrointestinal / 6.3.2. Modificadores da motilidade intestinal / 6.3.2.1. Laxantes e catárticos / 6.3.2.1.4. Laxantes osmóticos / Macrogol e outras associações
Condição Dispensa EF	Lavagens gastrointestinais e preparação para exames complementares de diagnóstico ou cirurgia
Via de administração	Administração oral
Informação adicional à dispensa	<p>O Macrogol e outras associações é um laxante osmótico. Poderá o próprio utente identificar ao farmacêutico que precisa do medicamento para preparação para exames complementares de diagnóstico ou cirurgia.</p> <p>Cabe ao farmacêutico prestar toda a informação (forma de preparação, administração e recomendações de utilização do medicamento), uma vez que existem especificidades de preparação e administração em cada um dos medicamentos que podem ser dispensados, para que posteriormente seja possível efetuar o exame complementar de diagnóstico ou cirurgia.</p>
Patologias ou situações em que é contraindicada ou não recomendado o Macrogol e outras associações	<ul style="list-style-type: none"> - Gravidez e/ou amamentação - Obstrução ou perfuração gastrointestinal - Ulceração intestinal ou gástrica, - Perturbações de esvaziamento gástrico (p. ex., gastroparesia) - Íleo - Fenilcetonúria (devido à presença de aspartamo) - Hipersensibilidade a qualquer dos componentes - Megacólon tóxico que complica estados inflamatórios muito graves do trato intestinal, incluindo doença de Crohn e colite ulcerativa - Reflexo de engasgo comprometido, ou com tendência para aspiração ou regurgitação - Comprometido estado de consciência - Insuficiência renal grave (depuração da creatinina < 30 ml/min) - Comprometimento cardíaco (NYHA de grau III ou IV) - Desidratação - Doença inflamatória aguda grave - Doentes frágeis debilitados ou cujo estado de saúde é fraco - Doentes com menos de 20 Kg de peso - Carcinoma avançado ou qualquer outra doença do cólon que origine uma fragilidade excessiva da mucosa
Interações medicamentosas	Não deve ser tomada qualquer medicação por via oral na hora anterior à administração do medicamento dado que pode ser eliminada do trato gastrointestinal e não ser absorvida. O efeito terapêutico de fármacos com um índice terapêutico reduzido ou semivida curta pode ser particularmente afetado.
Referências	<ul style="list-style-type: none"> - RCM dos seguintes medicamentos: Fortrans, Klean-Prep, Moviprep http://www.merckmanual.net/?id=93&cn=878 http://www.mhra.gov.uk/Howweregulate/Medicines/Licensingofmedicines/Legalstatusandclassification