

Protocolo de Dispensa Exclusiva em Farmácia (EF) O presente protocolo permite auxiliar o farmacêutico a dispensar o medicamento após análise, evitar a dispensa inapropriada caso não sejam cumpridas as condições estabelecidas e detetar situações que devem ser referenciada para a consulta médica.	
DCI / Dosagem	Fluticasona (50 microgramas/dose)
Classe farmacológica	14. Medicamentos usados em afeções otorrinolaringológicas./14.1 Produtos para aplicação nasal/14.1.2 Corticosteroides
Condição Dispensa EF	Prevenção e tratamento de rinite alérgica, em adultos
Via de administração	Administração nasal

1 – FATORES A TER EM CONSIDERAÇÃO:

- 1- Idade
- 2 - Hipersensibilidade à substância ativa ou aos excipientes
- 3 - Gravidez e aleitamento
- 4 - Medicação concomitante
- 5 - Eventual medicação tomada para a rinite alérgica (qual e quando)

2 – CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO (ou confirmação de diagnóstico indicado pelo utente):

- 6 - Sintomatologia (duração/intensidade)

CONDIÇÕES Dispensa EF

- Prevenção e tratamento de rinite alérgica, em adultos
- Idade igual ou superior a 18 anos.

CRITÉRIOS PARA REFERENCIAÇÃO PARA A CONSULTA MÉDICA:

- Idade inferior a 18 anos
- Se não tiver a certeza do diagnóstico
- Hipersensibilidade à substância ativa ou aos excipientes
- Utentes com qualquer uma das patologias ou situações mencionadas no anexo
- Utentes a tomar/utilizar os medicamentos indicados no anexo
- se os sintomas não melhorarem após 7 dias de tratamento

SE CUMPRE CUMULATIVAMENTE CONDIÇÕES DISPENSA “EF” DISPENSAR O MEDICAMENTO E PRESTAR INFORMAÇÃO / RECOMENDAÇÕES DE UTILIZAÇÃO:

Dosagem Máxima: 50 microgramas/dose
 Posologia: 2 aplicações em cada narina, uma vez por dia (100 microgramas por narina por dia), de preferência de manhã.
 Dose diária máxima: não exceder 4 aplicações em cada narina num dia (200 microgramas por narina por dia).

CUMPRE QUALQUER UM DOS CRITÉRIOS

↓

REFERENCIAÇÃO PARA A CONSULTA MÉDICA

Protocolo de Dispensa Exclusiva em Farmácia – Anexo Fluticasona	
DCI	Fluticasona (50 microgramas/dose)
Classe farmacológica	14. Medicamentos usados em afeções otorrinolaringológicas/ 14.1 Produtos para aplicação nasal/ 14.1.2 Corticosteroides
Condição Dispensa EF	Prevenção e tratamento de rinite alérgica, em adultos
Via de administração	Administração nasal
Informação adicional à dispensa	<p>A Fluticasona é um corticosteroide para pulverização nasal está indicado para o tratamento da rinite alérgica. Poderá o próprio utente identificar ao farmacêutico que se trata de rinite alérgica, por já ter diagnóstico médico prévio.</p> <p>Cabe ao farmacêutico, mediante a descrição dos sintomas por parte do utente, analisar se os sintomas se enquadram numa das situações de rinite alérgica abaixo descritas. Caso existam dúvidas relativamente ao diagnóstico ou ao tipo de rinite, o farmacêutico deverá reencaminhar para o médico.</p> <p><u>Prevenção e o tratamento de rinite alérgica, em adultos</u></p> <p>- Rinite alérgica: é uma reação alérgica às partículas que o ar transporta (em regra pólen e ervas, mas por vezes bolores, pós e pelo de animais). A rinite alérgica pode ser estacional ou perenial.</p> <p>Sintomas: espirros, ardor, comichão, nariz com comichão e entupido, corrimento nasal, ardor cutâneo, irritação nos olhos e olhos lacrimejantes. Os olhos podem inflamar-se (conjuntivite)</p> <p>- Rinite alérgica estacional: é uma alergia ao pólen que o ar transporta, vulgarmente chamada febre dos fenos ou polinose. As estações do pólen variam consideravelmente nas diversas regiões de um mesmo país. Acontece, por vezes, que a alergia estacional é causada por esporos de fungos.</p> <p>- Rinite alérgica perenial (todo o ano): é uma alergia que pode ser causada por vários agentes como ácaros do pó da casa, penas, pelo animal ou bolor. Apresenta sintomas semelhantes aos da rinite alérgica estacional, que variam, porém, de intensidade, geralmente de forma imprevisível, durante todo o ano. No entanto não é habitual o indivíduo ter conjuntivite.</p> <p>Mesmo que os sintomas apresentados pelo utente se enquadrem no acima descrito, se o farmacêutico considerar os mesmos de elevada gravidade/intensidade, o utente deverá ser reencaminhado para o médico.</p> <p>Deverão ser dadas as seguintes recomendações adicionais ao utente na dispensa do medicamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Poderá ser necessário 3 a 4 dias de tratamento contínuo para a melhoria dos sintomas. - Deve recorrer ao médico caso não se verifique uma melhoria dos sintomas dentro de 7 dias. - O utente deve ser aconselhado a efetuar na farmácia uma reavaliação após 10 dias após o início do tratamento <p>Instruções de utilização:</p> <p>1- Agitar suavemente antes de usar. Antes da primeira utilização de um novo frasco, ou se o frasco não for utilizado durante algum tempo, é necessário primeiro pressionar o inalador as vezes necessárias até produzir uma pulverização fina.</p> <p>2- Para usar o inalador, colocar o aplicador nasal numa narina enquanto fecha a outra assegurando que o aplicador nasal é afastado do septo nasal.</p> <p>3- Pulverizar na narina enquanto inspira e depois expira através da boca.</p>
Patologias ou situações em que é contraindicada ou não recomendada o/a fluticasona	<ul style="list-style-type: none"> - Hipersensibilidade à substância ativa ou aos excipientes - Gravidez e/ou amamentação - Infecções nas vias ou seios nasais - Lesão recente ou cirurgia nasal, ou problemas de ulceração no nariz

Interações medicamentosas	<ul style="list-style-type: none">- Outros corticosteroides (incluindo cremes, pomadas, comprimidos, medicação para asma, gotas nasais ou para os olhos, inaladores nasais.)- Inibidores da isoenzima 3A4 do sistema do citocromo P450 como por ex. cetozazol (para tratamento de infecções fúngicas)- Inibidores da protease como ritonavir (para tratamento do VIH)
Referências	<ul style="list-style-type: none">- RCM's dos seguintes medicamentos: Flixonase, Flutaide, Eustidil, Fluticasona Nasofan, Rontilona- http://www.manualmerck.net/?id=195&cn=1674